

UNIVERSITATEA [NUMELE UNIVERSITĂȚII]

FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII

Programul de studii: Biotehnologii

LUCRARE DE LICENȚĂ

Optimizarea producției de pigmenți carotenoidici de către o drojdie

Influența mediului de cultură, a temperaturii și a pH-ului la o tulpină de Rhodotorula

EXEMPLU FICTIV – structura, tabelele și figurile unei lucrări de licență. Datele sunt simulate.

Coordonator științific:

Lect. univ. dr. Mihai Preda (nume fictiv)

Absolvent:

Andreea Munteanu (nume fictiv)

BUCUREȘTI, 2026

DECLARAȚIE DE AUTENTICITATE

Subsemnatul(a) **Andreea Munteanu**, absolvent(ă) al(a) programului de studii Biotehnologii, declar pe propria răspundere că lucrarea de licență cu titlul „Optimizarea producției de pigmenți carotenoidici de către o drojdie” a fost elaborată de mine, sub îndrumarea coordonatorului științific, nu a mai fost prezentată la o altă facultate sau instituție de învățământ superior și că toate sursele folosite, inclusiv cele de pe internet, sunt citate în lucrare, cu respectarea regulilor privind drepturile de autor.

Data: [data]

Semnătura: [semnătura]

Majoritatea facultăților au un model oficial de declarație de autenticitate. Copiază-l exact din ghidul facultății și semnează-l; textul de aici este doar orientativ.
Sfat
20/05/2026 10:00

CUPRINS

Lista figurilor și a tabelelor.....	4
Rezumat.....	5
Introducere.....	6
Capitolul 1. Date bibliografice.....	7
1.1. Drojdiile producătoare de carotenoizi.....	7
1.2. Biosinteza carotenoizilor.....	7
1.3. Factorii care influențează producția.....	8
Capitolul 2. Material și metodă.....	9
2.1. Tulpina și mediile de cultură.....	9
2.2. Condiții de cultivare și design experimental.....	9
2.3. Metode analitice și statistice.....	9
Capitolul 3. Rezultate și discuții.....	11
3.1. Alegerea mediului de cultură (etapa 1).....	11
3.2. Curbele de creștere la diferite temperaturi (etapa 2).....	11
3.3. Efectul temperaturii asupra biomasei și a carotenoizilor.....	13
3.4. Efectul pH-ului inițial (etapa 3).....	14
3.5. Interpretarea rezultatelor.....	15
Concluzii.....	16
Bibliografie.....	17
Anexa 1. Protocolul de extracție și dozare a carotenoizilor.....	18
Bonus: același paragraf, înainte și după corectare.....	19

Cuprinsul arată din prima pagină logica lucrării: introducere, capitole teoretice, cercetarea proprie, concluzii. În Word îl generezi automat din stilurile de titlu (Referințe → Cuprins), ca să se actualizeze singur.

Ghid: licenta-disertatie-romania.co
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

Lista figurilor și a tabelelor

Listele de figuri și tabele sunt cerute de multe facultăți. În Word le generezi automat dacă pui titlurile cu Referințe → Inserare legendă, apoi Referințe → Inserare tabel de figuri.
Ghid: licenta-disertatie-romania.co
 Rolul secțiunii
 20/05/2026 10:00

Lista figurilor

Figura 1. Calea simplificată de biosinteză a carotenoizilor la drojdiile roșii.....	7
Figura 2. Factorii de cultivare care influențează producția de carotenoizi.....	8
Figura 3. Designul experimental: optimizare factor cu factor.....	9
Figura 4. Concentrația de carotenoizi pe cele trei medii (mg/L, media a 3 baloane).....	11
Figura 5. Curbele de creștere pe mediul M2 la patru temperaturi.....	12
Figura 6. Biomasa uscată medie la 96 h, pe temperaturi.....	13
Figura 7. Distribuția concentrației de carotenoizi pe temperaturi (4 baloane/variantă).....	14
Figura 8. Concentrația de carotenoizi în funcție de pH-ul inițial (mg/L).....	15

Lista tabelelor

Tabelul 1. Drojdii producătoare de carotenoizi și pigmenții lor principali.....	7
Tabelul 2. Compoziția mediilor de cultură testate (g/L).....	9
Tabelul 3. Etapa 1: biomasa și carotenoizii pe cele trei medii (26 °C, pH 6,0, 96 h).....	11
Tabelul 4. Etapa 2: densitatea optică (DO_{600}) a culturilor pe mediul M2, la patru temperaturi	12
Tabelul 5. Parametrii de creștere calculați din curbele de creștere.....	12
Tabelul 6. Biomasa uscată la 96 h în funcție de temperatură (g/L).....	13
Tabelul 7. Concentrația de carotenoizi la 96 h în funcție de temperatură (mg/L).....	13
Tabelul 8. Comparații perechi pentru carotenoizi (testul Tukey HSD).....	14
Tabelul 9. Etapa 3: efectul pH-ului inițial (mediul M2, 22 °C, 96 h).....	14

Rezumat

Rezumatul are de obicei 150–300 de cuvinte și spune pe scurt tema, obiectivul, metoda, rezultatele și concluzia. Multe facultăți îl cer și în limba engleză, cu 3–5 cuvinte-cheie.
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

Lucrarea urmărește optimizarea producției de carotenoizi la o tulpină de *Rhodotorula mucilaginosa*. Optimizarea s-a făcut factor cu factor, în trei etape: mediul de cultură (YPD, mediu cu glicerol și mediu mineral), temperatura (18, 22, 26 și 30 °C) și pH-ul inițial (4,5, 5,5 și 6,5). Creșterea a fost urmărită prin densitate optică și biomasă uscată, iar carotenoizii totali au fost dozați spectrofotometric. Mediul cu glicerol a dat cea mai mare concentrație de carotenoizi, deși YPD a dat mai multă biomasă. Creșterea a fost maximă la 26 °C, dar acumularea pigmentilor a fost maximă la 22 °C, iar pH-ul de 5,5 a fost cel mai favorabil. În condițiile optimizate concentrația a crescut cu circa 60% față de varianta inițială. Optimul pentru creștere nu coincide cu optimul pentru pigmenti, de aceea lucrarea propune o cultivare în două etape de temperatură.

Cuvinte-cheie: carotenoizi, *Rhodotorula*, optimizare, temperatură, glicerol, curbă de creștere

Abstract

This thesis aims to optimise carotenoid production by a *Rhodotorula mucilaginosa* strain. Optimisation was carried out one factor at a time, in three stages: culture medium (YPD, glycerol medium and mineral medium), temperature (18, 22, 26 and 30 °C) and initial pH (4.5, 5.5 and 6.5). Growth was followed by optical density and dry biomass, and total carotenoids were measured spectrophotometrically. The glycerol medium gave the highest carotenoid concentration, although YPD gave more biomass. Growth peaked at 26 °C, but pigment accumulation peaked at 22 °C, and pH 5.5 was the most favourable. Under the optimised conditions, the concentration increased by about 60% compared with the initial setting. Since the optimum for growth does not coincide with the optimum for pigment production, the thesis proposes a two-stage temperature cultivation.

Keywords: carotenoids, *Rhodotorula*, optimisation, temperature, glycerol, growth curve

Introducere

Carotenoizii sunt pigmenți galbeni, portocalii și roșii folosiți drept coloranți și antioxidanți în industria alimentară, în furaje și în cosmetică. Cea mai mare parte se obține prin sinteză chimică sau prin extracție din plante, iar producția microbiană este o alternativă care nu depinde de sezon și poate folosi substraturi ieftine [1].

Drojdiiile roșii din genul *Rhodotorula* sintetizează β -caroten, torulen și torularhodină și cresc bine pe glicerol, un subprodus al industriei biodieselului [2]. Randamentul depinde însă puternic de condițiile de cultivare.

Scopul lucrării este optimizarea condițiilor de cultivare pentru producția de carotenoizi la o tulpină de *Rhodotorula mucilaginosa* (cod fictiv RM-07). Obiectivele sunt:

1. alegerea mediului de cultură cu cea mai mare producție de carotenoizi;
2. stabilirea efectului temperaturii asupra creșterii și a producției de carotenoizi;
3. stabilirea pH-ului inițial optim pentru condițiile alese.

Introducerea prezintă produsul (carotenoizii), de ce contează producția microbiană, organismul folosit și obiectivele. La licență are 2-3 pagini; aici este prescurtată.

Ghid: licenta-disertatie-romania.com
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

Obiectivele unei lucrări de optimizare se formulează ca variabile măsurabile: „mediul cu cea mai mare concentrație de carotenoizi (mg/L)”, nu „îmbunătățirea procesului”.

Ghid: licenta-disertatie-romania.com
Sfat
20/05/2026 10:00

Capitolul 1. Date bibliografice

Capitolul de date bibliografice prezintă doar ce folosești mai departe: organismul, calea de biosinteză și factorii care influențează producția. La Biotehnologii sursele sunt mai ales articole din reviste de specialitate. Ghid: licenta-disertatie-romania.co
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

1.1. Drojdiile producătoare de carotenoizi

Puține drojdii sintetizează carotenoizi în mod natural. Cele mai studiate sunt drojdiile roșii (*Rhodotorula*, *Sporobolomyces*) și *Xanthophyllomyces dendrorhous*, singura drojdie folosită industrial pentru astaxantină (Tabelul 1) [2].

Tabelul 1. Drojdii producătoare de carotenoizi și pigmenții lor principali

Drojdia	Carotenoizi principali	Observații
<i>Rhodotorula</i> spp.	β -caroten, torulen, torularhodină	Creștere rapidă pe substraturi ieftine (glicerol, melasă)
<i>Sporobolomyces</i> / <i>Sporidiobolus</i> spp.	β -caroten, torulen, torularhodină	Drojdiile roșii înrudite cu <i>Rhodotorula</i>
<i>Xanthophyllomyces dendrorhous</i> (<i>Phaffia rhodozyma</i>)	Astaxantină	Folosită pentru astaxantina din hrana peștilor de crescătorie
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Nu produce în mod natural	Produce carotenoizi doar după modificare genetică

Sursa: Sinteză proprie după literatura de specialitate [2].

1.2. Biosinteza carotenoizilor

La drojdii, carotenoizii se formează pe calea mevalonatului: din acetil-CoA rezultă unitățile izoprenice IPP și DMAPP, apoi geranilgeranil-difosfatul (GGPP). Prin condensarea a două molecule de GGPP se formează fitoenul, care este desaturat treptat și ciclizat până la β -caroten sau torulen (Figura 1) [2].




Figura 1. Calea simplificată de biosinteză a carotenoizilor la drojdiile roșii

Sursa: Prelucrare proprie.

1.3. Factorii care influențează producția

Sursa de carbon modifică atât creșterea, cât și acumularea pigmentilor; glicerolul a dus în mai multe studii la un conținut de carotenoizi mai mare decât glucoza [3]. Temperatura are efecte diferite asupra creșterii și asupra carotenogenezei: optimul pentru pigmenți este adesea mai mic decât optimul pentru biomasă [4]. Factorii principali sunt rezumați în Figura 2; în această lucrare au fost studiați trei dintre ei: sursa de carbon, temperatura și pH-ul.




Figura 2. Factorii de cultivare care influențează producția de carotenoizi

Sursa: Prelucrare proprie.

Nu prelua cifre de randament din articole fără unități și condiții. „3 mg/L” și „300 µg/g” nu se pot compara direct: primul este o concentrație în mediu, al doilea un conținut raportat la biomasă.
Greșeală frecventă
20/05/2026 10:00

Capitolul 2. Material și metodă

Material și metodă trebuie să permită repetarea experimentului: tulpina, compoziția completă a mediilor, condițiile de cultivare, metodele analitice și testele statistice.
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

2.1. Tulpina și mediile de cultură

S-a folosit tulpina *Rhodotorula mucilaginosa* RM-07 din colecția laboratorului (cod fictiv), păstrată pe agar YPD la 4 °C. Au fost testate trei medii, cu compoziția din Tabelul 2.

Tabelul 2. Compoziția mediilor de cultură testate (g/L)

Componenta	M1 (YPD)	M2 (glicerol)	M3 (mineral)
Glucoză	20	–	20
Glicerol	–	20	–
Extract de drojdie	10	10	1
Peptonă	20	20	–
(NH ₄) ₂ SO ₄	–	–	5
KH ₂ PO ₄	–	–	1
MgSO ₄ · 7H ₂ O	–	–	0,5
pH inițial	6,0	6,0	6,0

Notă. Mediile au fost sterilizate prin autoclavare la 121 °C, 15 minute; glucoza a fost sterilizată separat.

Sursa: Rețete de laborator (exemplu).

2.2. Condiții de cultivare și design experimental

Culturile s-au realizat în baloane Erlenmeyer de 250 mL cu 50 mL mediu, inoculate cu 5% (v/v) dintr-o precultură de 24 h, pe agitator orbital la 180 rpm, timp de 96 h. Optimizarea s-a făcut factor cu factor, în trei etape (Figura 3): fiecare etapă a folosit cea mai bună variantă din etapa anterioară.



Figura 3. Designul experimental: optimizare factor cu factor

Sursa: Prelucrare proprie.

2.3. Metode analitice și statistice

Creșterea a fost urmărită prin densitatea optică la 600 nm (DO₆₀₀). Biomasa uscată s-a determinat gravimetric, după centrifugare, spălare și uscare la 105 °C până la masă constantă.

Carotenoizii totali au fost extrași cu dimetilsulfoxid și acetonă și dozați spectrofotometric la 450 nm, ca echivalenți de β -caroten, pe baza unei curbe de calibrare [5]. Protocolul complet se află în Anexa 1.

Diferențele dintre variante au fost testate cu ANOVA unifactorială și testul Tukey HSD ($\alpha = 0,05$), în programul R.

Descrie mediile cu toate componentele și concentrațiile lor, iar aparatele cu tipul lor (centrifugă, spectrofotometru UV-Vis). Comisia verifică dacă experimentul poate fi repetat după descrierea ta.
Sfat
20/05/2026 10:00

Capitolul 3. Rezultate și discuții

Aceasta este contribuția ta personală: rezultatele experimentelor tale, prelucrate statistic și interpretate. Urmează ordinea etapelor din design, iar fiecare rezultat este comparat cu literatura.
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

3.1. Alegerea mediului de cultură (etapa 1)

Mediul M1 (YPD) a dat cea mai mare biomasă, dar cea mai mare concentrație de carotenoizi s-a obținut pe M2, cu glicerol: 2,58 mg/L, față de 2,02 mg/L pe M1 (testul Tukey, $p = 0,011$) și 1,31 mg/L pe M3 (Tabelul 3, Figura 4). Pe M2 și conținutul specific a fost cel mai mare (312 $\mu\text{g/g}$). Rezultatul este în acord cu literatura [3], iar M2 a fost ales pentru etapele următoare.

Tabelul 3. Etapa 1: biomasa și carotenoizii pe cele trei medii (26 °C, pH 6,0, 96 h)

Mediul	Biomasa (g/L)	Carotenoizi (mg/L)	Conținut specific ($\mu\text{g/g}$)
M1 (YPD)	9,12 $\pm$ 0,38	2,02 $\pm$ 0,16	221
M2 (glicerol)	8,26 $\pm$ 0,41	2,58 $\pm$ 0,17	312
M3 (mineral)	5,84 $\pm$ 0,35	1,31 $\pm$ 0,14	224

Notă. Media $\pm$ abaterea standard, $n = 3$ baloane. Conținutul specific = carotenoizi / biomasă, calculat din medii. ANOVA: biomasă $F(2, 6) = 59,84$, $p < 0,001$; carotenoizi $F(2, 6) = 49,20$, $p < 0,001$.

Sursa: Date proprii de laborator (simulate pentru exemplu).




Figura 4. Concentrația de carotenoizi pe cele trei medii (mg/L, media a 3 baloane)

Sursa: Prelucrare proprie.

3.2. Curbele de creștere la diferite temperaturi (etapa 2)

La toate temperaturile, faza de lag a durat aproximativ 12 h. La 22–30 °C culturile au intrat în faza staționară după 60–72 h, iar la 18 °C creșterea a continuat până la 96 h (Tabelul 4, Figura 5). Viteza specifică maximă de creștere a fost cea mai mare la 26 °C (0,141 h^{-1}) și cea mai mică la 18 °C (0,094 h^{-1}) (Tabelul 5).

Tabelul 4. Etapa 2: densitatea optică (DO₆₀₀) a culturilor pe mediul M2, la patru temperaturi

Timp (h)	18 °C	22 °C	26 °C	30 °C
0	0,10	0,10	0,10	0,10
12	0,10	0,16	0,24	0,20
24	0,31	0,67	1,30	0,95
36	0,94	2,57	5,96	4,12
48	2,69	8,03	16,19	11,94
60	6,64	16,14	23,16	19,15
72	12,53	21,21	25,06	21,75
84	17,49	22,91	25,42	22,35
96	20,03	23,36	25,49	22,47

Notă. Media a 4 baloane. Peste DO 0,8 probele au fost diluate, iar valorile sunt recalculate.
Sursa: Date proprii de laborator (simulate pentru exemplu).




Figura 5. Curbele de creștere pe mediul M2 la patru temperaturi
Sursa: Prelucrare proprie.

Tabelul 5. Parametrii de creștere calculați din curbele de creștere

Temperatura	μ_{max} (h ⁻¹)	Timp de generație (h)	DO ₆₀₀ la 96 h
18 °C	0,094	7,4	20,03
22 °C	0,119	5,8	23,36
26 °C	0,141	4,9	25,49
30 °C	0,130	5,3	22,47

Notă. $\mu_{max} = \ln(DO_2 / DO_1) / (t_2 - t_1)$ pe intervalul cu creșterea cea mai rapidă (12–24 h); timpul de generație = $\ln 2 / \mu_{max}$.
Sursa: Calcul propriu pe baza Tabelului cu densitățile optice.

Calculează μ_{max} din datele tale și arată formula și intervalul folosit. O curbă de creștere fără parametri numerici este doar o imagine; parametrii permit compararea cu alte studii.
Sfat
20/05/2026 10:00

3.3. Efectul temperaturii asupra biomasei și a carotenoizilor

Temperatura a influențat semnificativ biomasa, $F(3, 12) = 11,12$, $p < 0,001$, $\eta^2 = 0,74$, cu un maxim de 8,47 g/L la 26 °C (Tabelul 6, Figura 6). Diferența față de 22 °C nu a fost semnificativă (Tukey, $p = 0,106$), dar la 26 °C viteza de creștere a fost cea mai mare.

Tabelul 6. Biomasa uscată la 96 h în funcție de temperatură (g/L)

Temperatura	n	Media	Abaterea standard
18 °C	4	6,98	0,42
22 °C	4	7,80	0,34
26 °C	4	8,47	0,31
30 °C	4	7,45	0,41

Notă. $F(3, 12) = 11,12$, $p < 0,001$, $\eta^2 = 0,74$

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor simulate.




Figura 6. Biomasa uscată medie la 96 h, pe temperaturi

Sursa: Prelucrare proprie.

Concentrația de carotenoizi a variat și ea semnificativ, $F(3, 12) = 63,32$, $p < 0,001$, $\eta^2 = 0,94$, dar maximum a apărut la 22 °C (3,07 mg/L), nu la 26 °C (Tabelul 7, Figura 7). Testul Tukey arată că varianta de 22 °C diferă semnificativ de toate celelalte (Tabelul 8).

Tabelul 7. Concentrația de carotenoizi la 96 h în funcție de temperatură (mg/L)

Temperatura	n	Media	Abaterea standard
18 °C	4	2,28	0,10
22 °C	4	3,07	0,18
26 °C	4	2,54	0,24
30 °C	4	1,46	0,12

Notă. $F(3, 12) = 63,32$, $p < 0,001$, $\eta^2 = 0,94$

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor simulate.




Figura 7. Distribuția concentrației de carotenoizi pe temperaturi (4 baloane/variantă)

Sursa: Prelucrare proprie.

Tabelul 8. Comparații perechi pentru carotenoizi (testul Tukey HSD)

Perechea	Diferența mediilor (mg/L)	p	Interpretare
18 °C – 22 °C	-0,80	< 0,001	Semnificativă
18 °C – 26 °C	-0,26	0,179	Nesemnificativă
18 °C – 30 °C	0,82	< 0,001	Semnificativă
22 °C – 26 °C	0,53	0,004	Semnificativă
22 °C – 30 °C	1,61	< 0,001	Semnificativă
26 °C – 30 °C	1,08	< 0,001	Semnificativă

Notă. Diferența = media primei temperaturi – media celei de-a doua; $\alpha = 0,05$.

Sursa: Prelucrare proprie (testul Tukey HSD), pe datele simulate.

3.4. Efectul pH-ului inițial (etapa 3)

La 22 °C, pe mediul M2, pH-ul inițial nu a influențat semnificativ biomasa ($p = 0,055$), dar a influențat concentrația de carotenoizi ($F(2, 6) = 9,74$, $p = 0,013$). Cea mai mare valoare s-a obținut la pH 5,5 (3,24 mg/L), semnificativ mai mare decât la pH 4,5 (Tukey, $p = 0,011$); diferența față de pH 6,5 nu a fost semnificativă (Tabelul 9, Figura 8).

Tabelul 9. Etapa 3: efectul pH-ului inițial (mediul M2, 22 °C, 96 h)

pH inițial	Biomasa (g/L)	Carotenoizi (mg/L)	Conținut specific (μg/g)
4,5	7,12 ± 0,30	2,58 ± 0,19	362
5,5	7,76 ± 0,27	3,24 ± 0,16	418
6,5	7,81 ± 0,33	2,97 ± 0,20	380

Notă. Media ± abaterea standard, n = 3 baloane. ANOVA: biomasă $F(2, 6) = 4,90$, $p = 0,055$; carotenoizi $F(2, 6) = 9,74$, $p = 0,013$.

Sursa: Date proprii de laborator (simulate pentru exemplu).

Nu raporta doar varianta cea mai bună. Comisia vrea să vadă toate variantele, cu abaterea standard și numărul de replicare, și testul care arată că diferența nu este întâmplătoare.
Greșeală frecventă
20/05/2026 10:00




Figura 8. Concentrația de carotenoizi în funcție de pH-ul inițial (mg/L)

Sursa: Prelucrare proprie.

3.5. Interpretarea rezultatelor

Rezultatele arată o separare clară între condițiile optime pentru creștere și cele pentru pigmenți. Temperatura de 26 °C favorizează creșterea, în timp ce 22 °C favorizează acumularea carotenoizilor: raportat la biomasă, conținutul de carotenoizi este de aproximativ 390 μg/g la 22 °C, față de 300 μg/g la 26 °C. Observația confirmă datele din literatură [4]: la temperaturi mai mici celulele cresc mai încet, dar acumulează mai mulți pigmenți.

În opinia noastră, pentru această tulpină cea mai bună strategie ar fi o cultivare în două etape: creștere la 26 °C până la sfârșitul fazei exponențiale (aproximativ 60 h), apoi trecerea la 22 °C pentru acumularea pigmenților, așa cum s-a propus și pentru alte drojdii roșii [6]. Combinația cea mai bună testată în lucrare este mediul M2, 22 °C și pH 5,5, cu 3,24 mg/L, cu aproximativ 60% mai mult decât varianta inițială pe YPD (2,02 mg/L).

Limite. Optimizarea factor cu factor nu surprinde interacțiunile dintre factori; un design factorial sau metoda suprafeței de răspuns ar fi pasul următor. Dozarea spectrofotometrică dă carotenoizii totali, fără separarea pigmentelor individuale, iar experimentele s-au făcut doar în baloane, nu în bioreactor.

Concluzii

- Mediul cu glicerol (M2) a dat cea mai mare concentrație de carotenoizi, deși YPD a dat mai multă biomasă.
- Creșterea a fost cea mai rapidă la 26 °C, iar acumularea carotenoizilor a fost maximă la 22 °C.
- pH-ul inițial de 5,5–6,5 a fost favorabil; la pH 4,5 producția a scăzut semnificativ.
- În condițiile optimizate (M2, 22 °C, pH 5,5) concentrația a crescut cu circa 60% față de varianta inițială pe YPD.

Direcții viitoare: un design factorial pentru interacțiunile dintre factori, cultivarea în două etape de temperatură, separarea pigmentilor prin HPLC și trecerea la bioreactor cu control al pH-ului și al aerării.

Concluziile răspund pe scurt la fiecare obiectiv, fără date noi. La Biotehnologii închei cu eficiența procesului și cu pașii spre scale-up.
Ghid: licenta-disertatie-romania.co
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

Bibliografie

1. Popescu A, Ionescu M. Pigmenți carotenoidici de origine microbiană: surse și aplicații. *Rev Biotechnol Apl.* 2021;9(2):45–58.
2. Dumitru E, Stan R. Biosinteza carotenoizilor la drojdiile roșii. *Stud Microbiol Ind.* 2020;6(1):12–27.
3. Marin L, Toma C, Neagu D. Influența sursei de carbon asupra producției de carotenoizi la *Rhodotorula* spp. *J Biotechnol Exemplu.* 2022;14(3):101–10.
4. Vasile D, Georgescu T. Efectul temperaturii asupra creșterii și carotenogenezei la drojdii. *Acta Biotechnol Exemplu.* 2023;5(2):33–41.
5. Enache C. Metode spectrofotometrice pentru dozarea pigmenților. București: Editura Exemplu; 2019.
6. Radu I, Pop S. Cultivarea în două etape pentru bioproducția de pigmenți. *Rev Biotechnol Apl.* 2024;12(1):5–17.

La Biotehnologii se folosește des
stilul Vancouver: sursele sunt
numerotate în ordinea în care apar în
text, nu alfabetic. Toate sursele de
mai jos sunt generice, inventate
pentru acest exemplu; în lucrarea ta
citezi doar articole reale, pe care le-
ai consultat.
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

Anexa 1. Protocolul de extracție și dozare a carotenoizilor

Protocoloalele pas cu pas, curbele de calibrare și datele brute se pun în anexă. În capitolul de metodă le rezumi și trimiți la anexă.
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

1. Se centrifughează 10 mL de cultură ($5.000 \times g$, 10 min) și se spală sedimentul de două ori cu apă distilată.
2. Se adaugă 2 mL dimetilsulfoxid preîncălzit la 55 °C, se agită 1 min și se incubează 1 h la 55 °C, pentru dezintegrarea celulelor.
3. Se adaugă 4 mL acetonă, se agită și se centrifughează; extracția cu acetonă se repetă până când sedimentul devine incolor.
4. Extractele reunite se trec în eter de petrol, iar faza organică se aduce la un volum cunoscut.
5. Se citește absorbanta la 450 nm față de un blanc cu eter de petrol.
6. Concentrația se calculează din curba de calibrare cu β -caroten și se exprimă în mg/L de cultură și în $\mu\text{g/g}$ biomasă uscată.

Toate operațiile se fac la lumină redusă, pentru că pigmentii se degradează la lumină și la oxigen. Solvenții se manipulează sub nișă.

Bonus: același paragraf, înainte și după corectare

Fragmentul de mai jos este scris intenționat cu greșelile pe care le întâlnim des în lucrările de Biotehnologii. Dedesubt este aceeași idee după corectare.

Această pagină nu face parte din lucrare. Arată cum se schimbă un paragraf la o corectare atentă: aceeași idee, scrisă clar, cu sursă și în stil academic.

Ghid: licenta-disertatie-romania.com
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

VARIANTA INIȚIALĂ

Drojdia a crescut cel mai bine la 26 de grade, deci aceasta este temperatura optima pentru productia de pigmenti. Am obtinut un randament foarte bun de 3 la 22 de grade, mult mai mare decat la celelalte temperaturi, ceea ce arata ca experimentul a reusit. Rhodotorula este o drojdie care face carotenoizi.

VARIANTA CORECTATĂ

Cea mai mare biomasă medie s-a obținut la 26 °C (8,47 g/L), în timp ce concentrația de carotenoizi a fost maximă la 22 °C (3,07 mg/L), semnificativ mai mare decât la celelalte temperaturi (ANOVA și testul Tukey; Tabelul 8). Optimumul pentru creștere nu coincide, așadar, cu optimumul pentru pigmenți, ceea ce corespunde observațiilor anterioare la *Rhodotorula* spp. [4].

CE AM CORECTAT

1. Am pus diacriticele (ș, ț cu virgulă) și am scris unitatea corect: „26 °C”, nu „26 de grade”.
2. „Randament de 3” a primit unitate și valoare exactă (mg/L); fără unitate cifra nu poate fi comparată.
3. Am separat optimumul pentru creștere de optimumul pentru pigmenți, care în text erau confundate.
4. „Mult mai mare” este susținut de testul statistic și de trimiterea la tabel; „experimentul a reușit” a dispărut.
5. Numele genului este scris în italic (*Rhodotorula*), iar afirmația generală are o sursă citată.

Vrei aceeași corectare pentru lucrarea ta? licenta-disertatie-romania.com/contact