

UNIVERSITATEA [NUMELE UNIVERSITĂȚII]

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Programul de studii: Medicină

LUCRARE DE LICENȚĂ

Studiu retrospectiv al pneumoniei comunitare la adult

Severitatea la internare, comorbiditățile și evoluția pacienților dintr-o secție de medicină internă

EXEMPLU FICTIV – structura, tabelele și figurile unei lucrări de licență. Datele sunt simulate.

Coordonator științific:

Prof. univ. dr. Adrian Ilie (nume fictiv)

Absolvent:

Andrei Munteanu (nume fictiv)

TIMIȘOARA, 2026

DECLARAȚIE DE AUTENTICITATE

Subsemnatul(a) **Andrei Munteanu**, absolvent(ă) al(a) programului de studii Medicină, declar pe propria răspundere că lucrarea de licență cu titlul „Studiu retrospectiv al pneumoniei comunitare la adult” a fost elaborată de mine, sub îndrumarea coordonatorului științific, nu a mai fost prezentată la o altă facultate sau instituție de învățământ superior și că toate sursele folosite, inclusiv cele de pe internet, sunt citate în lucrare, cu respectarea regulilor privind drepturile de autor.

Data: [data]

Semnătura: [semnătura]

Majoritatea facultăților au un model oficial de declarație de autenticitate. Copiază-l exact din ghidul facultății și semnează-l; textul de aici este doar orientativ.
Sfat
20/05/2026 10:00

CUPRINS

Lista figurilor și a tabelelor.....	4
Rezumat.....	5
Lista abrevierilor.....	6
Introducere.....	7
Capitolul 1. Pneumonia comunitară: date din literatură.....	8
1.1. Definiție și etiologie.....	8
1.2. Factori de risc.....	8
1.3. Diagnostic și evaluarea severității.....	9
Capitolul 2. Material și metodă.....	10
2.1. Tipul studiului și lotul.....	10
2.2. Variabile și analiză statistică.....	10
Capitolul 3. Rezultate și discuții.....	11
3.1. Caracteristicile lotului.....	11
3.2. Comorbiditățile.....	11
3.3. Severitatea la internare și evoluția.....	12
3.4. Durata spitalizării.....	13
3.5. Discuții.....	14
3.6. Concluziile autorului.....	14
Concluzii.....	15
Bibliografie.....	16
Anexa 1. Fișa de colectare a datelor.....	17
Bonus: același paragraf, înainte și după corectare.....	18

Cuprinsul arată din prima pagină logica lucrării: introducere, capitole teoretice, cercetarea proprie, concluzii. În Word îl generezi automat din stilurile de titlu (Referințe → Cuprins), ca să se actualizeze singur.

Ghid: licenta-disertatie-romania.co
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

Lista figurilor și a tabelelor

Listele de figuri și tabele sunt cerute de multe facultăți. În Word le generezi automat dacă pui titlurile cu Referințe → Inserare legendă, apoi Referințe → Inserare tabel de figuri.
Ghid: licenta-disertatie-romania.co
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

Lista figurilor

Figura 1. Factori de risc pentru pneumonia comunitară la adult.....	8
Figura 2. Etapele diagnosticului și ale evaluării severității.....	9
Figura 3. Etapele studiului.....	10
Figura 4. Comorbiditatea principală a pacienților (%).....	12
Figura 5. Distribuția pacienților pe clase de risc CURB-65.....	12
Figura 6. Pacienții cu complicații în fiecare clasă de risc CURB-65 (%).....	13
Figura 7. Durata spitalizării la cele două grupe de vârstă.....	13

Lista tabelelor

Tabelul 1. Abrevieri folosite în lucrare.....	6
Tabelul 2. Agenții etiologici ai pneumoniei comunitare la adult.....	8
Tabelul 3. Scorul CURB-65: criterii și interpretare.....	9
Tabelul 4. Criteriile de includere și de excludere.....	10
Tabelul 5. Caracteristicile lotului studiat.....	11
Tabelul 6. Comorbiditatea principală a pacienților.....	11
Tabelul 7. Evoluția pacienților în funcție de clasa de risc CURB-65.....	12
Tabelul 8. Durata spitalizării în funcție de grupa de vârstă.....	13
Tabelul 9. Sinteza rezultatelor în raport cu obiectivele.....	14

Rezumat

Pneumonia comunitară este o cauză frecventă de internare la adult, iar evaluarea severității la internare orientează îngrijirea pacientului. Studiul retrospectiv a analizat 120 de foi de observație ale pacienților internați cu pneumonie comunitară într-o secție de medicină internă (date simulate). Au fost urmărite vârsta, comorbiditatea principală, scorul CURB-65 la internare, complicațiile și durata spitalizării, analizate prin statistici descriptive, testul χ^2 și testul t. Majoritatea pacienților aveau 65 de ani și peste, iar hipertensiunea arterială a fost cea mai frecventă comorbiditate. Proporția pacienților cu complicații a crescut odată cu clasa de risc CURB-65, iar vârstnicii au avut o durată a spitalizării mai mare. Autorul recomandă notarea sistematică a scorului CURB-65 la internare și reevaluarea timpurie a pacienților cu risc intermediar și crescut.

Cuvinte-cheie: pneumonie comunitară, CURB-65, comorbidități, durata spitalizării, studiu retrospectiv

Abstract

Community-acquired pneumonia is a common cause of hospital admission in adults, and assessing severity on admission guides patient care. This retrospective study reviewed 120 medical records of patients admitted with community-acquired pneumonia to an internal medicine ward (simulated data). Age, main comorbidity, CURB-65 score on admission, complications and length of stay were recorded and analysed using descriptive statistics, the chi-square test and the t-test. Most patients were aged 65 or older, and hypertension was the most frequent comorbidity. The proportion of patients with complications increased with the CURB-65 risk class, and older patients had a longer hospital stay. The author recommends recording the CURB-65 score systematically on admission and reassessing patients in the intermediate and high-risk classes early.

Keywords: community-acquired pneumonia, CURB-65, comorbidities, length of stay, retrospective study

Rezumatul are de obicei 150–300 de cuvinte și spune pe scurt tema, obiectivul, metoda, rezultatele și concluzia. Multe facultăți îl cer și în limba engleză, cu 3–5 cuvinte-cheie.
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

Lista abrevierilor

La Medicină abrevierile se definesc la prima folosire în text și se adună într-o listă după cuprins. Verifică dacă facultatea o cere.
Ghid: licenta-disertatie-romania.co
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

Tabelul 1. Abrevieri folosite în lucrare

Abreviere	Semnificație
BPOC	bronhopneumopatie obstructivă cronică
CURB-65	scor de severitate: confuzie, uree, frecvență respiratorie, tensiune arterială, vârstă ≥ 65 de ani
PC	pneumonie comunitară
TA	tensiune arterială

Sursa: Lista proprie.

Introducere

Pneumonia comunitară (PC) este una dintre cele mai frecvente cauze de internare în secțiile de medicină internă și o cauză importantă de deces prin boli infecțioase, mai ales la vârstnici [1]. Evaluarea severității la internare, de exemplu cu scorul CURB-65, ajută medicul să decidă unde și cât de atent este urmărit pacientul [2].

Ipoteza de lucru este că pacienții cu un scor CURB-65 mai mare la internare au mai des complicații pe durata spitalizării. Obiectivele studiului sunt:

1. descrierea profilului demografic al pacienților internați cu PC;
2. identificarea comorbidităților asociate;
3. analiza relației dintre clasa de risc CURB-65 și evoluția pacienților;
4. compararea duratei spitalizării la pacienții sub 65 de ani și la vârstnici.

Introducerea arată de ce problema clinică este importantă și formulează ipoteza și obiectivele. La Medicină se scrie scurt, cu trimiteri la ghiduri și studii recente.

Ghid: licenta-disertatie-romania.co
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

La Medicină se citează în stil Vancouver: [1], [2, 3] în text și bibliografia numerotată în ordinea primei citări. Preferă ghidurile și articolele indexate în PubMed din ultimii 5–10 ani.
Sfat
20/05/2026 10:00

Capitolul 1. Pneumonia comunitară: date din literatură

Partea generală este un mini-review: definiție, etiologie, factori de risc, diagnostic și evaluarea severității. Nu copia capitolul din manual; păstrează doar ce folosești în partea practică.

Ghid: licenta-disertatie-romania.co

Rolul secțiunii

20/05/2026 10:00

1.1. Definiție și etiologie

PC este infecția acută a parenchimului pulmonar dobândită în afara spitalului, la o persoană care nu a fost internată recent [1]. Agenții etiologici sunt prezentați în Tabelul 2; numele speciilor se scriu cu italic.

Tabelul 2. Agenții etiologici ai pneumoniei comunitare la adult

Grupa	Exemple	Observații
Bacterii tipice	<i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Haemophilus influenzae</i>	Pneumococul este cel mai frecvent agent bacterian identificat
Bacterii atipice	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Chlamydomphila pneumoniae</i> , <i>Legionella</i> spp.	Nu se văd pe colorația Gram; diagnostic serologic, prin antigen urinar sau PCR
Virusuri respiratorii	virusurile gripale, virusul sincițial respirator, SARS-CoV-2	Pot produce pneumonie singure sau asociate cu o infecție bacteriană
Alți agenți	<i>Staphylococcus aureus</i> , bacili gram-negativi	Mai rari; apar mai ales la pacienții cu factori de risc

Notă. La o parte importantă dintre pacienți agentul etiologic nu este identificat.

Sursa: Sinteză proprie pe baza surselor [1, 3].

1.2. Factori de risc

Riscul de PC și de evoluție severă crește odată cu vârsta și cu bolile cronice care scad apărarea locală sau generală a organismului (Figura 1) [3].



Figura 1. Factori de risc pentru pneumonia comunitară la adult

Sursa: Prelucrare proprie.

1.3. Diagnostic și evaluarea severității

Diagnosticul se bazează pe simptomele respiratorii acute și pe evidențierea unui infiltrat pulmonar nou pe radiografia toracică (Figura 2). Severitatea se evaluează la internare; scorul CURB-65 folosește cinci criterii simple, câte un punct fiecare (Tabelul 3) [2].



Figura 2. Etapele diagnosticului și ale evaluării severității

Sursa: Prelucrare proprie.

Tabelul 3. Scorul CURB-65: criterii și interpretare

Litera	Criteriul	Puncte
C	Confuzie nou apărută	1
U	Uree serică > 7 mmol/l	1
R	Frecvența respiratorie $\geq 30/\text{min}$	1
B	TA sistolică < 90 mmHg sau TA diastolică ≤ 60 mmHg	1
65	Vârsta ≥ 65 de ani	1

Notă. Interpretare: 0–1 puncte – risc scăzut; 2 puncte – risc intermediar; 3–5 puncte – pneumonie severă, risc crescut. Scorul ajută decizia clinică, nu o înlocuiește.

Sursa: După Lim și colab. [2]

Nu include în lucrare scheme de tratament antibiotic cu doze copiate din ghiduri. Tratamentul se descrie la nivel general și cu trimitere la ghidul citat; o doză greșită într-o lucrare de licență la Medicină este o eroare gravă.
Greșeală frecventă
20/05/2026 10:00

Capitolul 2. Material și metodă

2.1. Tipul studiului și lotul

Studiul este observațional, retrospectiv, pe foile de observație ale pacienților internați cu PC într-o secție de medicină internă a unui spital județean, pe o perioadă de doi ani (date simulate). Criteriile de includere și de excludere sunt prezentate în Tabelul 4; lotul final cuprinde 120 de pacienți.

Tabelul 4. Criteriile de includere și de excludere

Criterii de includere	Criterii de excludere
Vârsta ≥ 18 ani	Pneumonie apărută la peste 48 de ore de la internare (nosocomială)
Diagnostic de pneumonie comunitară: simptome respiratorii acute și infiltrat pulmonar nou pe radiografie	Imunosupresie severă (chimioterapie, transplant)
Internare în secția de medicină internă în perioada studiului	Transfer din alt spital
Foaie de observație completă	Date lipsă pentru calculul scorului CURB-65

Sursa: Criterii stabilite de autor împreună cu coordonatorul.

2.2. Variabile și analiză statistică

Din fiecare foaie de observație s-au extras vârsta, sexul, comorbiditatea principală, elementele scorului CURB-65 la internare, complicațiile apărute (insuficiență respiratorie acută, revărsat pleural, sepsis) și durata spitalizării. Etapele studiului sunt prezentate în Figura 3.




Figura 3. Etapele studiului

Sursa: Prelucrare proprie.

Variabilele continue sunt descrise prin medie și abatere standard, iar cele categoriale prin frecvențe. S-au folosit testul χ^2 și testul t pentru eșantioane independente, cu pragul de semnificație $p < 0,05$.

Material și metodă trebuie să permită repetarea studiului: tipul studiului, perioada, lotul, criteriile, variabilele, analiza statistică și avizul etic.

Ghid: licenta-disertatie-romania.co

Rolul secțiunii

20/05/2026 10:00

Un studiu retrospectiv pe foi de observație are nevoie de avizul comisiei de etică a spitalului. Datele se anonimizează la extragere: fără nume, CNP, număr de foaie de observație sau date exacte ale internării.

Ghid: licenta-disertatie-romania.co

Greșeală frecventă

20/05/2026 10:00

Capitolul 3. Rezultate și discuții

Rezultatele se prezintă obiectiv, în ordinea obiectivelor; în discuții le interpretezi și le compari cu literatura. Această parte este contribuția ta personală.
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

3.1. Caracteristicile lotului

Tabelul 5. Caracteristicile lotului studiat

Variabila	N	Media	Abaterea standard	Minim	Maxim
Vârsta (ani)	120	66,9	13,9	29	94
Scor CURB-65	120	1,4	1,0	0	4
Durata spitalizării (zile)	120	8,5	3,2	3	18

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor simulate.

Lotul a cuprins 53 de bărbați (44,2%) și 67 de femei, cu vârsta medie de 66,9 ani (AS = 13,9); 74 de pacienți (61,7%) aveau 65 de ani și peste (Tabelul 5).

3.2. Comorbiditățile

Cea mai frecventă comorbiditate principală a fost hipertensiunea arterială (33,3%), iar doar 19,2% dintre pacienți nu aveau nicio boală cronică (Tabelul 6, Figura 4).

Tabelul 6. Comorbiditatea principală a pacienților

Comorbiditatea principală	Frecvență	Procent
Hipertensiune arterială	40	33,3%
Diabet zaharat	19	15,8%
BPOC	16	13,3%
Insuficiență cardiacă	14	11,7%
Boală cronică de rinichi	8	6,7%
Fără comorbidități	23	19,2%
Total	120	100%

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor simulate.




Figura 4. Comorbiditatea principală a pacienților (%)

Sursa: Prelucrare proprie.

3.3. Severitatea la internare și evoluția

Scorul CURB-65 mediu la internare a fost 1,4; în clasa de risc scăzut au fost 50,0% dintre pacienți, în clasa intermediară 35,8%, iar în clasa de risc crescut 14,2% (Figura 5). Pe durata internării, 43 de pacienți (35,8%) au prezentat cel puțin o complicație.




Figura 5. Distribuția pacienților pe clase de risc CURB-65

Sursa: Prelucrare proprie.

Proporția pacienților cu complicații crește odată cu clasa de risc (Tabelul 7, Figura 6): $\chi^2(2) = 16,78$, $p < 0,001$, $V \text{ Cramer} = 0,37$. Rezultatul confirmă ipoteza de lucru.

Tabelul 7. Evoluția pacienților în funcție de clasa de risc CURB-65

Clasa de risc CURB-65 / Evoluția	Fără complicații	Cu complicații	Total
Scăzut (0-1)	48 (80,0%)	12 (20,0%)	60
Intermediar (2)	24 (55,8%)	19 (44,2%)	43
Crescut (3-5)	5 (29,4%)	12 (70,6%)	17

Notă. $\chi^2(2, N = 120) = 16,78$, $p < 0,001$, $V \text{ Cramer} = 0,37$

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor simulate.




Figura 6. Pacienții cu complicații în fiecare clasă de risc CURB-65 (%)

Sursa: Prelucrare proprie.

3.4. Durata spitalizării

Pacienții de 65 de ani și peste au avut o durată medie a spitalizării de 9,16 zile, față de 7,46 zile la cei sub 65 de ani, $t(118) = 2,92$, $p = 0,004$, $d = 0,55$ (Tabelul 8, Figura 7).

Tabelul 8. Durata spitalizării în funcție de grupa de vârstă

Variabila	65 de ani și peste: M (AS)	Sub 65 de ani: M (AS)	t	df	p	d Cohen
Durata spitalizării (zile)	9,16 (3,38)	7,46 (2,63)	2,92	118	0,004	0,55

Notă. n 65 de ani și peste = 74, n Sub 65 de ani = 46.

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor simulate.




Figura 7. Durata spitalizării la cele două grupe de vârstă

Sursa: Prelucrare proprie.

Separă clar rezultatele de discuții: în Rezultate spui ce ai găsit, cu cifre; în Discuții explici ce înseamnă și compari cu alte studii. Nu repeta aceleași cifre în ambele.
Sfat
20/05/2026 10:00

3.5. Discuții

Relația dintre clasa CURB-65 și complicații este în acord cu studiul care a validat scorul [2] și cu recomandările ghidurilor de a folosi un instrument de evaluare a severității la internare [1]. Durata mai mare a spitalizării la vârstnici poate fi explicată de comorbidități și de recuperarea funcțională mai lentă [4].

Limitele studiului țin de designul retrospectiv (date lipsă, înregistrare neuniformă), de lotul dintr-un singur centru și de faptul că mortalitatea și reinternările după externare nu au fost urmărite.

3.6. Concluziile autorului

Tabelul 9. Sinteza rezultatelor în raport cu obiectivele

Obiectivul	Rezultatul principal	Interpretarea autorului
O1. Profilul pacienților	Vârsta medie 66,9 ani; 61,7% au 65 de ani și peste	Pneumonia internată este în primul rând o boală a vârstnicului
O2. Comorbiditățile	Cea mai frecventă comorbiditate: hipertensiunea arterială (33,3%)	Majoritatea pacienților au cel puțin o boală cronică
O3. Severitatea și evoluția	Complicațiile cresc de la clasa de risc scăzut la cea de risc crescut ($p < 0,001$)	CURB-65 la internare ajută la identificarea pacienților care trebuie urmăriți atent
O4. Durata spitalizării	9,16 față de 7,46 zile la vârstnici, respectiv la adulții sub 65 de ani	Vârstnicii au nevoie de planificarea din timp a externării

Sursa: Prelucrare proprie.

Pe baza rezultatelor, autorul consideră utilă notarea sistematică a scorului CURB-65 în foaia de observație la internare și reevaluarea pacienților din clasele intermediară și crescută în primele 48 de ore, după protocolul secției.

Concluzii

1. Majoritatea pacienților internați cu pneumonie comunitară au 65 de ani și peste și cel puțin o comorbiditate.
2. Hipertensiunea arterială este cea mai frecventă comorbiditate principală în lotul studiat.
3. Proporția complicațiilor crește odată cu clasa de risc CURB-65 calculată la internare.
4. Pacienții vârstnici au o durată a spitalizării mai mare decât adulții sub 65 de ani.

Concluziile sunt scurte, numerotate sau sub formă de listă, derivate strict din rezultate. Nu introduc informații noi și nu repetă discuția.
Ghid: licenta-disertatie-romania.co
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

Bibliografie

1. Metlay JP, Waterer GW, Long AC, Anzueto A, Brozek J, Crothers K, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia. An official clinical practice guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. *Am J Respir Crit Care Med*. 2019;200(7):e45–67.
2. Lim WS, van der Eerden MM, Laing R, Boersma WG, Karalus N, Town GI, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. *Thorax*. 2003;58(5):377–82.
3. Stanciu M, Rusu D. *Pneumologie pentru studenți*. București: Editura Exemplu; 2021.
4. Iordache C, Neagu A, Toma R. Durata spitalizării la vârstnicii cu pneumonie comunitară. *Revista de Medicină Internă*. 2022;19(2):33–40.

Referințele sunt numerotate în ordinea primei citări (stil Vancouver). Ghidul ATS/IDSA și articolul lui Lim și colab. sunt surse reale; celelalte sunt generice, inventate pentru acest exemplu. În lucrarea ta citezi doar surse reale, verificate.
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

Anexa 1. Fișa de colectare a datelor

1. Cod pacient (de exemplu P001), fără date de identificare.
2. Vârsta (ani), sexul.
3. Comorbiditatea principală și celelalte boli cronice.
4. La internare: confuzie (da/nu), uree serică (mmol/l), frecvența respiratorie (/min), TA sistolică și diastolică (mmHg).
5. Scorul CURB-65 calculat (0–5).
6. Complicații pe durata internării: insuficiență respiratorie acută, revărsat pleural, sepsis, altele.
7. Durata spitalizării (zile).

Fișa de colectare arată ce date ai extras din fiecare foaie de observație. Pune în anexă și avizul comisiei de etică.

Ghid: licenta-disertatie-romania.co

Rolul secțiunii

20/05/2026 10:00

Bonus: același paragraf, înainte și după corectare

Fragmentul de mai jos este scris intenționat cu greșelile pe care le întâlnim des în lucrările de Medicină. Dedesubt este aceeași idee după corectare.

Această pagină nu face parte din lucrare. Arată cum se schimbă un paragraf la o corectare atentă: aceeași idee, scrisă clar, cu sursă și în stil academic.

Ghid: licenta-disertatie-romania.com
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

VARIANTA ÎNȚIALĂ

Pacientul D.M. din salonul 3, internat pe 12.01.2024, avea CURB 4 și a făcut complicații. Majoritatea pacienților cu scor mare au făcut complicații, deci scorul CURB-65 prezice perfect evoluția. Pneumonia e cea mai gravă boală infecțioasă din lume.

VARIANTA CORECTATĂ

În lotul studiat, proporția pacienților cu complicații a crescut de la clasa de risc scăzut la clasa de risc crescut, $\chi^2(2) = 16,78$, $p < 0,001$ (Tabelul 7). Rezultatul este în acord cu studiul de validare a scorului CURB-65 [2], dar designul retrospectiv și lotul dintr-un singur centru nu permit generalizarea.

CE AM CORECTAT

1. Am eliminat inițialele, salonul și data internării: datele pacienților se anonimizează.
2. Am pus diacriticele (ș, ț cu virgulă), obligatorii în lucrare.
3. Un caz izolat a fost înlocuit cu rezultatul pe tot lotul, cu testul statistic și trimiterea la tabel.
4. „Prezice perfect” a devenit o formulare prudentă, însoțită de limitele studiului.
5. Afirmația exagerată fără sursă a fost eliminată; comparația cu literatura are trimitere Vancouver.

Vrei aceeași corectare pentru lucrarea ta? licenta-disertatie-romania.com/contact